

# Un enfoque diferente para el manejo de la PTI crónica

TAVALISSE es un medicamento oral que puede ayudarle a manejar la trombocitopenia inmunitaria crónica al proteger sus plaquetas de la destrucción

## ¿Qué es TAVALISSE?

TAVALISSE es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con recuentos bajos de plaquetas debido a la PTI crónica cuando un tratamiento previo para la PTI no ha funcionado lo suficientemente bien. Se desconoce si TAVALISSE es seguro y eficaz en niños.

 **Tavalisse**<sup>®</sup>  
(fostamatinib disodium hexahydrate) tablets



Consulte la información importante sobre seguridad en las páginas 20-21 y en la información de prescripción completa que la acompaña.

# ¿Está pensando en tomar TAVALISSE o ya lo está tomando?

Este folleto puede proporcionar respuestas a preguntas frecuentes

**TAVALISSE es un medicamento oral que puede ayudarlo a manejar la trombocitopenia inmunitaria crónica (PTI) protegiendo sus plaquetas de la destrucción.**

Recuerde que su proveedor de atención médica es el mejor recurso para aconsejarle sobre su salud y su tratamiento. Hable con él sobre su afección y si TAVALISSE podría ser adecuado para usted.



Consulte la información importante sobre seguridad en las páginas 20-21 y en la información de prescripción completa que la acompaña.

# Información clave sobre la PTI crónica y TAVALISSE

## Una guía para preguntas y respuestas frecuentes

¿Qué es la PTI? .....	4
¿Cómo se trata la PTI crónica? .....	6
¿Cómo funciona TAVALISSE?.....	8
¿Qué resultados puedo esperar por tomar TAVALISSE?.....	10
¿Cómo debo tomar TAVALISSE? .....	12
¿Cuál es la información de seguridad más importante que debo conocer sobre TAVALISSE? .....	14
¿Qué formas hay disponibles para ayudarme a integrar TAVALISSE a mi estilo de vida? .....	17
¿Qué apoyo tengo a mi disposición mientras tomo TAVALISSE? .....	18
Información de seguridad importante para TAVALISSE .....	20

# La PTI puede provocar hemorragias graves y otras complicaciones

## La PTI crónica puede ser una afección grave y debe manejarse adecuadamente

### ¿Qué es la PTI?

PTI es la abreviatura de trombocitopenia (TROM-BO-CI-TO-PE-NIA) inmunitaria.

La PTI es un trastorno autoinmunitario, lo que significa que el sistema inmunitario del organismo ataca y destruye las plaquetas de la sangre. La PTI también puede ralentizar la capacidad del organismo para producir más plaquetas.

### ¿Qué es la PTI crónica?

La PTI puede llegar a ser crónica, lo que sucede cuando el recuento de plaquetas es bajo durante mucho tiempo. La PTI crónica puede ser una afección grave si no se trata. Es importante saber que la PTI crónica se puede manejar con un tratamiento.


Es posible que necesite consultar a un nuevo proveedor de atención médica que se especialice en el tratamiento de trastornos sanguíneos, como un hematólogo-oncólogo (llamado “hem-onc” de forma abreviada).

Tenga en cuenta que la PTI no es cáncer y no es contagiosa.

### ¿Qué son las plaquetas?

Las plaquetas son pequeñas células de la sangre que se agrupan para formar un coágulo y detener la hemorragia cuando se daña un vaso sanguíneo. Por ejemplo, cuando su cuerpo forma una costra, o coágulo, sobre una lesión, las plaquetas son las primeras células en el lugar que comienzan el proceso de cicatrización.

Las personas con PTI tienen cantidades más bajas de plaquetas en la sangre, lo que dificulta la formación de coágulos sanguíneos.



## ¿Qué ocurre cuando tiene un recuento bajo de plaquetas?

Un recuento bajo de plaquetas puede provocar hemorragias y otros problemas. El cuerpo de cada persona es diferente, por lo que sus síntomas pueden variar. Sus síntomas pueden incluir:



- Pequeños puntos rojizos-morados (llamados petequias)
- Facilidad para la formación de hematomas



- Hemorragia de encías o nariz
- Hematomas o manchas rojo sangre en la boca



- Flujo menstrual muy abundante o durante mucho tiempo
- Hemorragia interna (por ejemplo, en el estómago, los intestinos o el cerebro)



“Intento no estar cohibido por mis hematomas, pero me gustaría poder hacer algo más acerca de ellos.”

— Paciente que vive con PTI crónica

# El tratamiento es individualizado

## ¿Cuál es el objetivo del tratamiento?

El objetivo del tratamiento de la PTI es reducir el riesgo de hemorragia aumentando el recuento de plaquetas. El número objetivo de plaquetas necesarias variará de una persona a otra. Usted y su proveedor de atención médica determinarán el tratamiento adecuado para lograr ese objetivo.

Muchas personas se fijan objetivos en función de sus estilos de vida y actividades cotidianas. Escriba sus propios objetivos y otras prioridades personales. Compártalos con su proveedor de atención médica cuando comente sus opciones de tratamiento.

## ¿Cuál es el recuento plaquetario adecuado para mí?

Cada persona es diferente. Usted y su proveedor de atención médica determinarán cuál es el objetivo plaquetario adecuado para usted.

Los proveedores de atención médica suelen considerar el tratamiento cuando una persona con PTI tiene:

- Recuento de plaquetas inferior a 20,000 por microlitro ( $\mu\text{L}$ )
- Síntomas hemorrágicos



“ Mis plaquetas habían estado disminuyendo y mi médico me dijo que tendríamos que empezar un nuevo tratamiento... Quería encontrar uno que se adaptara a mi estilo de vida. ”

— Paciente que vive con PTI crónica

# Hay 2 maneras de aumentar el recuento de plaquetas

Los tratamientos para la PTI se eligen en función de las necesidades de la persona

¿Qué hacen los tratamientos para la PTI?

**PRODUCEN  
MÁS  
PLAQUETAS**

Algunos tratamientos estimulan la médula ósea para que produzca más plaquetas.



**DETIENEN  
LA DESTRUCCIÓN  
DE PLAQUETAS**

Algunos tratamientos suprimen el sistema inmunitario para ralentizar la destrucción plaquetaria, que es la causa subyacente de la enfermedad.

# TAVALISSE funciona de forma diferente a otros tratamientos para la PTI crónica

Tratamiento dirigido para detener la destrucción de plaquetas en un punto clave del proceso de la enfermedad

¿Cómo funciona TAVALISSE para tratar la PTI crónica?



## TRATAMIENTO DIRIGIDO

TAVALISSE se dirige directamente a una enzima del organismo llamada tirosina cinasa del bazo (spleen tyrosine kinase, SYK).

La SYK es una parte importante de la cadena de acontecimientos que hace que el sistema inmunitario destruya las plaquetas en la PTI.

Todos tenemos SYK en el cuerpo, incluso las personas a las que se les ha extirpado el bazo.



## DETIENE LA DESTRUCCIÓN DE PLAQUETAS

TAVALISSE bloquea el proceso que hace que el sistema inmunitario ataque las plaquetas. Esto significa que se destruyen menos plaquetas, lo que ayuda a aumentar el recuento de plaquetas en el organismo para reducir el riesgo de hemorragia.




## PRIMERO Y ÚNICO

TAVALISSE es el primer y único tratamiento oral para adultos con PTI crónica que actúa sobre el proceso de destrucción plaquetaria.

Consulte la información importante sobre seguridad en las páginas 20-21 y en la información de prescripción completa que la acompaña.





## ¿Cuál es la información de seguridad más importante que debo conocer sobre TAVALISSE?

### TAVALISSE puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Presión arterial alta (hipertensión).** La aparición o el empeoramiento de la presión arterial alta es frecuente en las personas tratadas con TAVALISSE y puede ser grave. Su proveedor de atención médica controlará regularmente su presión arterial durante el tratamiento con TAVALISSE. Si es necesario, su proveedor de atención médica puede comenzar a tratarlo con medicamentos para la presión arterial o cambiarle el medicamento actual para tratar su presión arterial. Informe a su proveedor de atención médica si tiene dolores de cabeza, confusión, mareos, dolor en el pecho o falta de aire.
- **Problemas hepáticos.** Los cambios en los análisis de sangre de la función hepática son frecuentes con TAVALISSE. Pueden producirse problemas hepáticos y pueden ser graves. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre con regularidad para comprobar cómo funciona su hígado durante el tratamiento con TAVALISSE.

 **Tavalisse**<sup>®</sup>  
(fostamatinib disodium hexahydrate) tablets

# TAVALISSE puede ayudarle a alcanzar sus objetivos de tratamiento

## TAVALISSE ha ayudado a los pacientes a aumentar y mantener sus recuentos de plaquetas

En estudios en los que se incluyó a 150 adultos con PTI crónica, TAVALISSE se comparó con placebo (un comprimido de azúcar) para ver su eficacia en la elevación del recuento de plaquetas durante 6 meses. Todos los pacientes de estos estudios habían tomado al menos un tratamiento previo que no funcionaba lo suficientemente bien como para manejar su PTI crónica, como esteroides, inmunoglobulinas, rituximab, agonistas del receptor de trombopoyetina y/o esplenectomía.

**No importa en qué parte del trayecto de su tratamiento se encuentre: los pacientes que se beneficiaron de TAVALISSE lo hicieron independientemente del tipo o la cantidad de tratamientos que habían probado en el pasado.**

### ¿Qué resultados puedo esperar por tomar TAVALISSE?



## AUMENTO DEL RECUENTO DE PLAQUETAS CON TAVALISSE

Al inicio de los estudios de TAVALISSE, los pacientes con PTI crónica presentaban un recuento bajo de plaquetas, con una media de 16,000 plaquetas por microlitro. Algunos pacientes que respondieron al tratamiento experimentaron un aumento significativo en sus recuentos de plaquetas, que alcanzaron un promedio de

**97,000**  
plaquetas por microlitro<sup>3</sup>



## LAS PLAQUETAS AUMENTAN EN SEMANAS

La mayoría de los pacientes que tuvieron una respuesta positiva al tomar TAVALISSE experimentaron un aumento de los recuentos de plaquetas durante las primeras semanas de tratamiento, mientras que otros tardaron más tiempo en ver una respuesta.

Su proveedor de atención médica controlará su número de plaquetas y realizará los ajustes de dosis adecuados para usted.

Después de tomar TAVALISSE durante 3 meses, su proveedor de atención médica debería poder decirle si está respondiendo al tratamiento.

Consulte la información importante sobre seguridad en las páginas 20-21 y en la información de prescripción completa que la acompaña.

<sup>3</sup>Un subconjunto de pacientes que tomaron TAVALISSE en estos estudios presentó una respuesta estable, a los que se definió como aquellos que tenían un recuento de plaquetas de más de 49,999 plaquetas por microlitro al menos 4 veces durante los últimos 3 meses del estudio. Estos números, 16,000 y 97,000 plaquetas por microlitro, son el recuento plaquetario medio desde el inicio y el final del estudio en estos pacientes.

El cuerpo de cada persona es diferente, por lo que su respuesta a TAVALISSE puede variar. Su médico controlará sus recuentos de plaquetas, vigilará cualquier efecto secundario y hará cambios en su tratamiento para ayudarle a alcanzar sus objetivos.



## RESPUESTA COMPROBADA QUE PERDURA

La mayoría de los pacientes que respondieron al tratamiento con TAVALISSE han mantenido un aumento del recuento de plaquetas en un estudio de seguimiento de 5 años.<sup>b</sup>

<sup>b</sup>Se trata de pacientes que lograron una respuesta a TAVALISSE en una cantidad de tiempo razonable, definida en este estudio como alcanzar un recuento de plaquetas de más de 49,999 plaquetas por microlitro en los 3 meses (12 semanas) siguientes al inicio del tratamiento.



## ¿Cuál es la información de seguridad más importante que debo conocer sobre TAVALISSE? (continuación)

### TAVALISSE puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Diarrea.** La diarrea es frecuente en personas tratadas con TAVALISSE y puede ser grave. Informe a su proveedor de atención médica si tiene diarrea durante el tratamiento con TAVALISSE. Su proveedor de atención médica puede recomendarle cambios en su dieta, beber más agua o tomar medicamentos para limitar estos síntomas.
- **Disminución del recuento de glóbulos blancos (neutropenia).** La disminución del recuento de glóbulos blancos es frecuente con TAVALISSE y puede ser grave. Esto puede aumentar su riesgo de infección, incluso infecciones graves. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre con regularidad para controlar su recuento de glóbulos blancos.

Su proveedor de atención médica puede cambiarle la dosis, interrumpir temporal o permanentemente el tratamiento con TAVALISSE si tiene efectos secundarios.

 **Tavalisse**<sup>®</sup>  
(fostamatinib disodium hexahydrate) tablets

# El beneficio de un medicamento oral

## TAVALISSE no tiene restricciones dietéticas

### ¿Cómo debo tomar TAVALISSE?

Su proveedor de atención médica encontrará el programa de tratamiento adecuado para usted. Puede que decidan ajustar la dosis de sus comprimidos o con qué frecuencia los toma en función de su respuesta al tratamiento. Asegúrese de tomar TAVALISSE exactamente como se lo han indicado.



**MEDICAMENTO  
ORAL DOS VECES AL DÍA**



**TÓMELO CON O  
SIN ALIMENTOS**

### ¿Con qué frecuencia controlará mi proveedor de atención médica mi respuesta?

Su proveedor de atención médica comprobará su recuento sanguíneo completo (que incluye plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos), función hepática y presión arterial. Puede cambiar su dosis en función de los resultados de su prueba.

### ¿Cuánto tiempo debo tomar TAVALISSE?

TAVALISSE debe tomarse todos los días según lo indicado, incluso si empieza a sentirse mejor. Esto es importante para manejar sus recuentos de plaquetas.

Su proveedor de atención médica le dirá que siga tomando TAVALISSE siempre que funcione para mantener el recuento de plaquetas y usted siga respondiendo al tratamiento.

Si es necesario realizar cambios en su dosis de TAVALISSE, su proveedor de atención médica le avisará.



“ Me gusta tomar mi primer comprimido cuando me levanto y mi segundo comprimido después de cenar. Me alegra que no importe si tomo [TAVALISSE] con el estómago vacío o no. ”

— Paciente tratado con TAVALISSE

## ¿Qué debo consultar con mi proveedor de atención médica antes de tomar TAVALISSE?

Antes de tomar TAVALISSE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- tiene presión arterial alta
- tiene problemas hepáticos
- está embarazada o planea quedar embarazada. TAVALISSE puede dañar al bebé en gestación.
- Su proveedor de atención médica comprobará si está embarazada antes de comenzar el tratamiento con TAVALISSE.
- Las mujeres que puedan quedar embarazadas deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con TAVALISSE y durante al menos 1 mes después de la última dosis.

**Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma**, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar TAVALISSE junto con determinados medicamentos puede afectar la acción de los otros medicamentos o la acción de TAVALISSE.

## ¿Qué más debo saber sobre tomar TAVALISSE?

Si omite una dosis de TAVALISSE, tome la siguiente a la hora programada regularmente. Si toma TAVALISSE en exceso, llame a su proveedor de atención médica de inmediato o acuda a la sala de emergencias del hospital más cercano de inmediato.

 **Tavalisse**<sup>®</sup>  
(fostamatinib disodium hexahydrate) tablets

# Comprensión de los posibles efectos secundarios

## Información importante sobre TAVALISSE

### ¿Cuál es la información de seguridad más importante que debo conocer?

Su proveedor de atención médica le explicará los eventos adversos graves y frecuentes que las personas pueden tener mientras toman TAVALISSE y le dará consejos sobre cómo manejar algunos de ellos.

Los efectos secundarios más frecuentes de TAVALISSE incluyen:

- Diarrea
- Presión arterial alta
- Náuseas
- Erupción cutánea
- Mareos
- Cansancio
- Problemas hepáticos
- Infección respiratoria
- Dolor de pecho
- Dolor de estómago (abdominal)
- Disminución del recuento de glóbulos blancos (neutropenia)

Estos no son todos los efectos secundarios de TAVALISSE. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede notificar efectos secundarios a la FDA, al 1-800-FDA-1088.

Su proveedor de atención médica querrá saber cómo se encuentra tomando TAVALISSE. Puede cambiar su dosis, interrumpir temporal o permanentemente el tratamiento con TAVALISSE si tiene efectos secundarios.



“ Cuando empecé a tomar TAVALISSE, mi médico me explicó los posibles efectos secundarios. Estaba preparado y me sentí cómodo de que serían manejables si me ocurrían. ”

— Paciente tratado con TAVALISSE

## Si tengo diarrea, ¿hay formas de manejarla?

Su proveedor de atención médica puede recomendar lo siguiente:



**Manténgase hidratado.** Para evitar la deshidratación, beba líquidos a lo largo del día, como agua, electrolitos, té descafeinado y caldo claro.



**Realice cambios en su dieta.** Coma pequeñas comidas con frecuencia y limite los alimentos picantes, grasos o con alto contenido de fibra (como nueces o semillas).



**Tome medicamentos.** Algunos medicamentos antidiarreicos de venta libre pueden ayudar a proporcionar alivio. Su proveedor de atención médica puede ayudarle con recomendaciones específicas.

 **Tavalisse**<sup>®</sup>  
(fostamatinib disodium  
hexahydrate) tablets



“Son las pequeñas cosas para mí, ahora que mis recuentos de plaquetas están altos... Siento que puedo salir más y divertirme con mis amigos. No estoy tan preocupado por mi PTI como antes.”

— Paciente tratado con TAVALISSE

Consulte la información importante sobre seguridad en las páginas 20-21 y en la información de prescripción completa que la acompaña.



# Adapte TAVALISSE a su estilo de vida

## Consejos para un tratamiento más exitoso

Es importante que tome TAVALISSE todos los días según lo indicado por su proveedor de atención médica. Crear una rutina diaria ayudará a que TAVALISSE sea una parte habitual de su estilo de vida. Estos son algunos consejos para empezar. Encuentre el método que más le convenga.



Configure una alarma diaria en su teléfono móvil o un recordatorio de calendario para avisarle cuando sea el momento de tomar su medicamento.

También hay una serie de aplicaciones disponibles para ayudarle a mantenerse en el buen camino. Elija una que le convenga.



Puede relacionar la toma de su medicamento dos veces al día con su rutina actual.

Por ejemplo, podría ligarla al cepillado de los dientes por la mañana y antes de acostarse, o podría ligarla al desayuno y la cena.



Los amigos y la familia pueden ayudarle a recordar que tome su medicamento y que siga su plan de tratamiento por el buen camino.

Hable con ellos y cree un plan que funcione para usted.



*Mi diario de tratamiento* fue diseñado para ayudarle a incorporar TAVALISSE a su estilo de vida, controlar su progreso y ayudarle a seguir por el buen camino.

Asegúrese de compartir la información que registre en este diario con su proveedor de atención médica en cada cita.

Descargue este diario de tratamiento en  
**TAVALISSE.com**

**Tavalisse**  
(fostamatinib disodium hexahydrate) tablets

# TAVALISSE TOGETHER: en colaboración con usted a lo largo del trayecto de su tratamiento

TAVALISSE TOGETHER es un programa para adultos con PTI crónica que están tomando o están interesados en tomar TAVALISSE. TAVALISSE TOGETHER se asocia con usted a lo largo del trayecto de su tratamiento, ayudándolo a tener éxito con su tratamiento para la PTI y le permite alcanzar sus objetivos.

TAVALISSE TOGETHER puede ayudarlo con perspectivas, consejos y motivación a cada paso del camino para que pueda concentrarse en lo que es importante. Cuanto más sepa sobre la PTI, qué esperar del tratamiento y cómo aprovechar al máximo las conversaciones con su proveedor de atención médica, estará mejor preparado para seguir por el buen camino con su tratamiento.

## Recibirá:



**Mensajes de texto y correos electrónicos** diseñados para lo que es importante para usted.



**Consejos y perspectivas** para ayudarlo a tener un inicio sin problemas y un éxito a largo plazo con TAVALISSE mediante el desarrollo de hábitos para ayudarlo a tomarlo como se lo han recetado.



**Herramientas para ayudarlo a establecer objetivos** para su tratamiento y estilo de vida, y formas de ayudarlo a comentarlos con su proveedor de atención médica.



**Consejo sobre cómo superar los obstáculos del tratamiento**, como saltarse una dosis o si se produce un efecto secundario.

**Únase a TAVALISSE TOGETHER: ¡inscríbese ahora! Únase hoy de una de estas tres maneras sencillas:**

Visite [TAVALISSETOGETHER.com](https://TAVALISSETOGETHER.com)



Envíe el mensaje de texto: JOIN al 35587



Escanee este código con su teléfono móvil





## Disponible para ayudarlo con su seguro, acceso financiero y apoyo para TAVALISSE

- **Coordinación** con su plan de seguro y con sus proveedores de atención médica para comprender la cobertura
- **Determinación** de la elegibilidad y facilitación de la inscripción en programas de copago y asistencia financiera
- **Contacto** con usted para responder a las preguntas que pueda tener cuando empiece a tomar TAVALISSE



**Orientación  
del personal de  
enfermería**



**Especialistas en  
reembolsos**



**Asistencia  
financiera y de  
copago**

**PARA INSCRIBIRSE EN RIGEL ONECARE, llame al 1-833-rigelOC (833-744-3562) o 650-449-8646, de lunes a viernes, de 8 AM a 8 PM ET.**

## Pague tan solo USD 15 por receta con la asistencia de copago de TAVALISSE

- Complete y envíe su información para determinar si es elegible
- Imprima la tarjeta de copago y téngala a mano cuando hable con la farmacia especializada

**INSCRÍBASE EN [TAVALISSEcopay.com](https://TAVALISSEcopay.com)**

**Los pacientes elegibles pueden recibir TAVALISSE con un copago de USD 15 por cada receta, si pagan a través de un seguro comercial.**

- Los pacientes deben ser mayores de 18 años de edad
- Esta oferta no es válida para recetas con reembolso de Medicare, Medicaid, TriCare o cualquier otro programa federal o estatal, o donde la ley lo prohíba
- El paciente será responsable de cualquier gasto que pague de su bolsillo después del límite anual de USD 25,000
- Esta oferta no es un seguro y es válida solo para recetas surtidas en los Estados Unidos y Puerto Rico
- No es válido para pacientes que pagan en efectivo
- Pueden aplicarse otras restricciones. El paciente es responsable del impuesto aplicable, si corresponde

 **Tavalisse**<sup>®</sup>  
(fostatinib disodium  
hexahydrate) tablets

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

## ¿Qué es TAVALISSE?

TAVALISSE es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con recuentos bajos de plaquetas debido a la PTI crónica cuando un tratamiento previo para la PTI no ha funcionado lo suficientemente bien. Se desconoce si TAVALISSE es seguro y eficaz en niños.

## ¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre TAVALISSE?

### **TAVALISSE puede causar efectos secundarios graves, incluidos:**

- **Presión arterial alta (hipertensión).** La aparición o el empeoramiento de la presión arterial alta es frecuente en las personas tratadas con TAVALISSE y puede ser grave. Su proveedor de atención médica controlará regularmente su presión arterial durante el tratamiento con TAVALISSE. Si es necesario, su proveedor de atención médica puede comenzar a tratarlo con medicamentos para la presión arterial o cambiarle el medicamento actual para tratar su presión arterial. Informe a su proveedor de atención médica si tiene dolores de cabeza, confusión, mareos, dolor en el pecho o falta de aire.
- **Problemas hepáticos.** Los cambios en los análisis de sangre de la función hepática son frecuentes con TAVALISSE. Pueden producirse problemas hepáticos y pueden ser graves. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre con regularidad para comprobar cómo funciona su hígado durante el tratamiento con TAVALISSE.

- **Diarrea.** La diarrea es frecuente en personas tratadas con TAVALISSE y puede ser grave. Informe a su proveedor de atención médica si tiene diarrea durante el tratamiento con TAVALISSE. Su proveedor de atención médica puede recomendarle cambios en su dieta, beber más agua o tomar medicamentos para limitar estos síntomas.
- **Disminución del recuento de glóbulos blancos (neutropenia).** La disminución del recuento de glóbulos blancos es frecuente con TAVALISSE y puede ser grave. Esto puede aumentar su riesgo de infección, incluso infecciones graves. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre con regularidad para controlar sus recuentos de glóbulos blancos.

Su proveedor de atención médica puede cambiarle la dosis, interrumpir temporal o permanentemente el tratamiento con TAVALISSE si tiene efectos secundarios.

## ¿Qué debo consultar con mi proveedor de atención médica antes de tomar TAVALISSE?

**Antes de tomar TAVALISSE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:**

- tiene presión arterial alta
- tiene problemas hepáticos
- está embarazada o planea quedar embarazada. TAVALISSE puede dañar al bebé en gestación.
  - Su proveedor de atención médica comprobará si está embarazada antes de comenzar el tratamiento con TAVALISSE.
  - Las mujeres que puedan quedar embarazadas deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con TAVALISSE y durante al menos 1 mes después de la última dosis.

**Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma,** incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar TAVALISSE junto con determinados medicamentos puede afectar la acción de los otros medicamentos o la acción de TAVALISSE.

## ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TAVALISSE?

Los efectos secundarios más frecuentes de TAVALISSE incluyen:

- Náuseas, erupción cutánea, mareos, cansancio, infección respiratoria, dolor torácico y dolor de estómago (abdominal).

Estos no son todos los efectos secundarios de TAVALISSE. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede notificar efectos secundarios a la FDA, al 1-800-FDA-1088.

 **Tavalisse**<sup>®</sup>  
(fostamatinib disodium hexahydrate) tablets

# Una oportunidad para que tenga una defensa duradera contra la PTI crónica

**RESULTADOS INICIALES:** Aumento del recuento de plaquetas observado en las semanas siguientes al inicio del tratamiento en la mayoría de los pacientes

**BENEFICIOS DURADEROS:** Se ha demostrado que los beneficios del tratamiento perduran con la terapia a largo plazo

**TRATAMIENTO DIRIGIDO:** Funciona de forma diferente para limitar la destrucción de plaquetas y aumentar los recuentos de plaquetas con el tiempo

**SE AJUSTA A SU ESTILO DE VIDA:** Ofrece la comodidad de un comprimido que se puede tomar con o sin alimentos



Es hora de adoptar un enfoque diferente del tratamiento.  
Hable con su proveedor de atención médica para iniciar TAVALISSE ahora.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TAVALISSE?

Los efectos secundarios más frecuentes de TAVALISSE incluyen:

- Náuseas, erupción cutánea, mareos, cansancio, infección respiratoria, dolor torácico y dolor de estómago (abdominal).

Consulte la información importante sobre seguridad en las páginas 20-21 y en la información de prescripción completa que la acompaña.



© 2021 Rigel Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. TAVAJTP-21285 1221  
TAVALISSE y RIGEL ONECARE son marcas comerciales registradas y TAVALISSE TOGETHER es una marca comercial de Rigel Pharmaceuticals, Inc.  
RIGEL ONECARE es un centro de apoyo al paciente patrocinado por Rigel Pharmaceuticals, Inc.



Déjenos un Me gusta y síganos en  
[Facebook.com/TAVALISSE](https://www.facebook.com/TAVALISSE)

MÁS INFORMACIÓN EN  
[TAVALISSE.com](https://www.TAVALISSE.com)

**Tavalisse**  
(fostamatinib disodium hexahydrate) tablets